

Lieber Patient, Liebe Patientin

Bei Ihnen wurde ein Eingriff durchgeführt mit anschliessender, offener Wundbehandlung.

Nachbehandlung

Schmerzmittel:

- Mephadolor 500 mg
max. 4x täglich

Hinweis:

Die Schmerzmittel können Sie nach Bedarf einnehmen, jedoch nicht mehr als 4 Tabletten pro Tag.

Haben Sie keine Schmerzen, benötigen Sie keine Schmerzmittel.

Verbandswechsel

Ihre Wunde muss täglich neu verbunden werden.

Nehmen Sie den Verband vor dem Duschen ab.

Duschgel / Shampoo sind kein Problem, solange Sie die Wunde anschliessend gründlich mit Wasser ausspülen. Am Besten mit dem Strahl direkt in die Wunde spülen, sofern schmerzmassig aushaltbar.

Nach dem Duschen: Tragen Sie Flammazine-Salbe in die Wunde auf.

Verbinden Sie die Wunde anschliessend mit Kompressen und Verband / Mefix / Pflaster.

Hinweis:

Es wird sich weiss-gelblicher Wundelag bilden, sogenannter Fibrin.

Dieser ist nicht gefährlich, sondern ein Nährboden für Bakterien, wodurch eine regelmässige, gründliche Wundpflege wichtig ist.

Bei Rötung, Hitze oder Eiter-Austritt: Kontaktieren Sie uns!

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.