

Lieber Patient, Liebe Patientin

Bei Ihnen wurde ein Eingriff an der Zehe / Finger, respektive am Zehennagel / Fingernagel durchgeführt.

## Nachbehandlung

### Schmerzmittel:

- Irfen 600 mg / Tilur 60 mg  
Gegen leichte Schmerzen  
max. 4x täglich
- Minalgin 500 mg  
Gegen mittelstarke Schmerzen  
Max. 4x täglich

### Hinweis:

Die Schmerzmittel können Sie nach Bedarf einnehmen.  
Haben Sie keine Schmerzen, benötigen Sie keine Schmerzmittel.  
Bei starken Schmerzen können Sie die beiden Medikamente kombinieren und bis zu je 4x täglich einnehmen.

### Verbandswechsel

Baden Sie den betreffenden Fuss oder Hand im Kamillosan (Verdünnung siehe Verpackung) während 10-15 Minuten 1x täglich.

Tragen Sie auf die Wunde Flammazine-Salbe auf.

Verbinden Sie die betroffene Zehe oder Finger mit Kompressen und Verband während 2-3 Tagen, solange die Wunde blutet. Danach kann anstatt einem Verband auf ein normales Pflaster gewechselt werden.

### Hinweis:

Sollten Sie am Operationstag Schmerzen verspüren, weil der Verband zu fest angezogen ist, können Sie diesen mit der Schere etwas einschneiden, damit sich der Druck löst.

Sollte beim ersten Verbandswechsel der Verband zu fest kleben, können Sie damit direkt ins Fuss- / Fingerbad. So kann er sich vollsaugen und gut gelöst werden.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.