

Lieber Patient, Liebe Patientin

Bei Ihnen wurde eine Zirkumzision (Beschneidung) durchgeführt.

## Nachbehandlung

### Schmerzmittel:

- Algifor Sirup: \_\_\_\_\_
- Irfen 600 mg  
Gegen leichte Schmerzen  
max. 4x täglich
- Minalgin 500 mg  
Gegen mittelstarke Schmerzen  
Max. 4x täglich

### Hinweis:

Die Schmerzmittel können Sie nach Bedarf einnehmen.  
Haben Sie keine Schmerzen, benötigen Sie keine Schmerzmittel.  
Bei starken Schmerzen können Sie die beiden Medikamente kombinieren und bis zu je 4x täglich einnehmen.

### Verbandswechsel

Beim Wasserlösen sollte der Verband gewechselt werden, da er sonst nass wird.

Entfernen Sie die Kompressen. Tragen Sie nach dem Wasserlösen etwas Bepanthere-Salbe auf die Naht auf. Umwickeln Sie diese wieder mit einer Kompresse.

Nach dem Duschen:

Füllen Sie ein Becken mit lauwarmem Wasser und Kamilloosan (Verdünnung siehe Verpackung). Mit einer Kompressen, die Sie im Kamilloosan tunken, können Sie die Wunde reinigen. Danach tragen Sie Bepanthere-Salbe auf die Naht und umwickeln diese wieder mit einer Kompresse.

### Hinweis:

Die Fäden lösen sich nach ca. 14 Tagen auf. Bis dahin sollte die beschriebene Pflege durchgeführt werden.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.