

Lieber Patient, Liebe Patientin

Bei Ihnen wurde ein Eingriff am Darmausgang durchgeführt mit anschliessender, offener Wundbehandlung.

Nachbehandlung

Schmerzmittel:

- | | | |
|---|--|--|
| ○ Irfen 600 mg
Gegen leichte
Schmerzen
max. 4x täglich | ○ Minalgin 500 mg
Gegen
mittelstarke
Schmerzen
Max. 8x täglich | ○ Dafalgan 1g
Gegen leichte
Schmerzen
max. 4x täglich |
|---|--|--|

Hinweis:

Die Schmerzmittel können Sie nach Bedarf einnehmen.
Haben Sie keine Schmerzen, benötigen Sie keine Schmerzmittel.
Bei starken Schmerzen können Sie die Medikamente kombinieren.

Sonstige Arzneimittel

- Paragol N Paraffinöl
Zum Weichhalten des Stuhlgangs.
3x täglich 20 ml
➔ Bei flüssigem Stuhlgang absetzen oder reduzieren

Verbandswechsel

Ihre Wunde muss täglich neu verbunden werden, respektive nach jedem Stuhlgang.

Nehmen Sie den Verband vor dem Duschen ab.

Duschgel / Shampoo sind kein Problem, solange Sie die Wunde anschliessend gründlich mit Wasser ausspülen. Am besten mit dem Strahl direkt in die Wunde spülen, sofern schmerzmassig aushaltbar.

Nach dem Duschen: Tragen Sie Flammazine-Salbe in die Wunde auf.

Verbinden Sie die Wunde anschliessend mit Kompressen und Verband / Mefix / Pflaster.

Hinweis:

Es kann sich weiss-gelblicher Wundbelag bilden, sogenanntes Fibrin. Dieses ist nicht gefährlich, jedoch ein Nährboden für Bakterien, deshalb ist eine regelmässige und gründliche Wundpflege wichtig.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.